



L'IGIENE MANI CON SOLUZIONE IDROALCOLICA

Come **frizionare** le mani con la soluzione alcolica

Usa la soluzione alcolica per l'igiene delle mani. Se sono visibilmente sporche lavale con acqua e sapone.



Durata della
procedura:
20-30 secondi



L' IGIENE MANI CON ACQUA E SAPONE

Come lavarsi le mani con acqua e sapone

Lava le mani con acqua e sapone se sono visibilmente sporche, altrimenti usa la soluzione alcolica.




Durata della procedura:
40-60 secondi



ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

APPLICAZIONE DI MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICO E/O CON LACCI



1. Rimuovere dalle mani e dai polsi monili se presenti.
2. Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.





Applicare la mascherina chirurgica, assicurandosi che questa aderisca al volto.

- Indossare la mascherina posizionando gli elastici dietro le orecchie o nel caso dei lacci partire dal laccio superiore, legandolo dietro la nuca, ed in seguito il laccio inferiore, legandolo dietro al collo.
- Tirare la mascherina dai bordi superiore ed inferiore per aprire completamente le pieghe.
- Modella il rinforzo nasale metallico.



ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

RIMOZIONE DI MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICO E/O CON LACCI

Durante le operazioni di rimozione di DPI è importante limitare la possibilità di auto-contaminazione. Una volta indossati i DPI si dovranno sempre considerare "aree inquinate" che espongono l'operatore e l'ambiente ad elevato rischio di contaminazione. Da questo momento in poi ogni gesto dovrà essere attentamente controllato e le mani decontaminate in caso di avvenuta contaminazione. I DPI vanno rimossi e, se monouso, smaltiti nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo prima di uscire dalla stanza di isolamento.

	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>
	<p>Rimuovere la mascherina chirurgica evitando di toccare la parte esterna e/o interna, toccando quindi solo gli elastici o i lacci. Durante questo passaggio è utile mantenere il capo flesso in avanti per ridurre la possibilità di auto-contaminazione.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>

APPLICAZIONE DI FILTRANTE FACCIALE (FFP2 – FFP3)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere dalle mani e dai polsi monili se presenti. 2. Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.
	<p>Applicare il filtrante facciale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appoggiare sul palmo della mano la mascherina e far passare i laccetti sul dorso della mano. • Portare la mascherina sul volto, la base sul mento e lo stringinaso sopra il naso, in modo da coprirlo. • Posizionare l'elastico superiore sulla nuca, e l'elastico inferiore attorno al collo al di sotto delle orecchie. • Modellare lo stringinaso con entrambe le mani affinché aderisca perfettamente al naso. • Con entrambe le mani, modellare il filtrante facciale affinché aderisca completamente la volto ed eseguire la prova di tenuta *
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>




* Coprire con le due mani il respiratore evitando di muoverlo dalla propria posizione. Espirare al fine di esercitare una pressione positiva. Se viene avvertita una perdita di aria, aggiustare la posizione del filtrante facciale e/o la tensione degli elastici e ripetere la prova.

* Per i respiratori con valvola: coprire il respiratore con le mani, inspirare rapidamente. Se si sentono perdite dai bordi riposizionare il facciale fino a ottenere una perfetta tenuta sul volto.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

RIMOZIONE DI FILTRANTE FACCIALE (FFP2 – FFP3)






Durante le operazioni di rimozione di DPI è importante limitare la possibilità di auto-contaminazione. Una volta indossati i DPI si dovranno sempre considerare "aree inquinate" che espongono l'operatore e l'ambiente ad elevato rischio di contaminazione. Da questo momento in poi ogni gesto dovrà essere attentamente controllato e le mani decontaminate in caso di avvenuta contaminazione. I DPI vanno rimossi e, se monouso, smaltiti nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo prima di uscire dalla stanza di isolamento.

	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>
	<p>Afferrare con entrambe le mani i passanti elastici e, facendoli scivolare sopra la nuca, rimuovere il filtrante facciale senza toccare la parte anteriore. Durante questo passaggio è utile mantenere il capo flesso in avanti per ridurre la possibilità di auto-contaminazione.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

VESTIZIONE CON CAMICE E UN PAIO DI GUANTI

- **DPI UTILIZZATI:** camice, protezione respiratoria, occhiale/visiera, guanti
- **CONTESTO DI UTILIZZO:** isolamento da contatto, isolamento per patogeni trasmessi attraverso droplets



	<p>Rimuovere dalle mani e dai polsi monili se presenti.</p> <p>Recarsi nell'ambiente dedicato alla vestizione e verificare di avere a disposizione tutti i DPI necessari e la loro integrità.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>
	<p>Indossare il camice monouso che deve coprire il busto, dal collo alle ginocchia, e le braccia fino alla fine dei polsi e avvolgere la schiena.</p>
	<p>Indossare la mascherina chirurgica o il facciale filtrante in caso di isolamento per via aerea e/o durante le manovre che generano aerosol.</p>
	<p>Indossare gli occhiali o in alternativa la visiera di protezione.</p>
	<p>Indossare i guanti calzandoli fin sopra il polsino del camice.</p>

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

SVESTIZIONE CON CAMICE E UN PAIO DI GUANTI



Una volta indossati i DPI si dovranno sempre considerare "aree inquinate" che espongono l'operatore e l'ambiente ad elevato rischio di contaminazione. Da questo momento in poi ogni gesto dovrà essere attentamente controllato e le mani decontaminate in caso di avvenuta contaminazione. I DPI vanno rimossi e, se monouso, smaltiti nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo prima di uscire dalla stanza di isolamento, ad eccezione del facciale filtrante che va rimosso dopo aver lasciato la stanza del paziente e chiuso la porta. Se il DPI è riutilizzabile, gettarlo nel contenitore per la decontaminazione.

MODALITA' DI SVESTIZIONE 1

	<p>Dopo essere usciti dalla stanza di isolamento, recarsi nella zona filtro o nel luogo adibito alla vestizione.</p>
	<p>Rimuovere i guanti, dopo aver slacciato il camice anteriormente per agevolare la svestizione.</p>
	<p>Slacciare posteriormente il camice afferrandolo per i lembi superiori, sfilarlo ripiegando le maniche su sé stesse e in modo da toccare solo la parte interna.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>
	<p>Rimuovere gli occhiali di protezione/visiera sollevando la fascia, se presente, da dietro la testa con movimento del capo in avanti.</p>
	<p>Rimuovere la mascherina chirurgica o il facciale filtrante, facendo attenzione a non contaminarsi durante questa manovra.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI




MODALITA' DI SVESTIZIONE 2

	<p>Dopo essere usciti dalla stanza di isolamento, recarsi nella zona filtro o nel luogo adibito alla vestizione.</p>
	<p>Afferrare il camice dalla parte anteriore e, rompendo i lacci, allontanarlo dal corpo. Arrotolare il camice al rovescio e rimuoverlo contemporaneamente ai guanti.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>
	<p>Rimuovere gli occhiali di protezione/visiera sollevando la fascia, se presente, da dietro la testa con movimento del capo in avanti.</p>
	<p>Rimuovere la mascherina chirurgica o il facciale filtrante.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

VESTIZIONE CON TUTA INTEGRALE


- **DPI UTILIZZATI:** cuffia, calzari, tuta integrale, guanti due paia, filtrante facciale, schermo facciale
- **CONTESTO DI UTILIZZO:** isolamento per via aerea (esempio: EBOLA, COVID-19...)

	<p>L'operatore, dopo essersi recato nell'ambiente dedicato alla vestizione, verifica di avere a disposizione tutti i dispositivi necessari e la loro integrità.</p> <p>Prima di procedere alla vestizione è necessario avere mani e polsi liberi da monili e i capelli raccolti.</p> <p>Indossare la cuffia, se necessaria, ed i calzari.</p>
	<p>Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.</p>
	<p>Indossare il primo paio di guanti.</p>
	<p>Applicare il facciale filtrante ed eseguire la prova di tenuta.</p>
	<p>Indossare la tuta fissandola sotto al mento chiudendo completamente la cerniera, i guanti devono restare sotto il polsino</p>
	<p>Indossare la visiera, nel caso di utilizzo di occhiali protettivi, questi andranno applicati prima di applicare il cappuccio della tuta.</p>
	<p>Indossare il secondo paio di guanti, calzandoli sopra il polsino della tuta.</p>

ISTRUZIONI DI UTILIZZO DPI

SVESTIZIONE CON TUTA INTEGRALE

Una volta indossati i DPI si dovranno sempre considerare "aree inquinate" che espongono l'operatore e l'ambiente ad elevato rischio di contaminazione. Da questo momento in poi ogni gesto dovrà essere attentamente controllato e le mani decontaminate in caso di avvenuta contaminazione. I DPI vanno rimossi e, se monouso, smaltiti nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo prima di uscire dalla stanza di isolamento, ad eccezione del facciale filtrante che va rimosso dopo aver lasciato la stanza del paziente e chiuso la porta. Se il DPI è riutilizzabile, gettarlo nel contenitore per la decontaminazione.

	Dopo essere usciti dalla stanza di isolamento, recarsi nella zona filtro o nel luogo adibito alla vestizione.
	Rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
	Rimuovere la visiera sollevando la fascia da dietro il capo, con movimento della testa in avanti. Nel caso di utilizzo di occhiali questi andranno rimossi dopo aver sfilato la tuta.
	Slacciare la cerniera per rimuovere la tuta, alzando il collo e flettendolo posteriormente;
	Afferrare il cappuccio esternamente con entrambe le mani arrotolandolo verso l'esterno per liberare la testa. Mantenere il capo eretto per evitare di toccare collo e petto con il filtrante facciale;
	Liberare le spalle facendo scivolare la tuta verso il basso fino ai fianchi, quindi sfilare le maniche;
	Rimuovere la tuta toccando solo la parte interna e aiutandosi con i piedi.
	Igienizzare i guanti con soluzione idroalcolica.
	Rimuovere il facciale filtrante.
	Rimuovere i calzari e, se presente, la cuffia.
	Rimuovere i guanti.
	Praticare l'igiene delle mani con soluzione idroalcolica o, se non disponibile, con acqua e sapone.