

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CREMONA

Consultorio

Via San Sebastiano, 14 – edificio B
Tel. 0372 408662- 408656
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30
Martedì, dalle 10.30 alle 12.30

Vaccinazioni

Via Dante 134
Tel. 0372 408616
Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 11.30
Mail: vaccinazioni@asst-cremona.it

Ospedale di Cremona, Ostetricia e Ginecologia

Via Largo Priori, 1 – 7° piano
Tel. 0372 405638 - 225

CASALMAGGIORE

Consultorio

Palazzo delle Opere Pie
Piazza Garibaldi, 3
Tel. 0375 284161
Lunedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
Da martedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

Vaccinazioni

Via Sandor Petofi 4
Tel. 335 1051054
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.45
Mail: vaccinazioni.casal@asst-cremona.it

Ospedale Oglio Po, Ostetricia e Ginecologia

Via Staffolo, 51 Vicomoscato
Tel. 0375 281501

VACCINAZIONI IN GRAVIDANZA



GUIDA PER LE FUTURE MAMME

Per proteggere mamma e bambino

A cura di
Vaccinazioni e Consultori
di Cremona e Casalmaggiore

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ASST Cremona
ATS Val Padana

PER LE GRAVIDE, L'ACCESSO AI CENTRI VACCINALI O AGLI HUB È SEMPRE SENZA PRENOTAZIONE E SENZA ATTESA.

In gravidanza hanno grande rilevanza e possono essere ricevute le seguenti vaccinazioni:

- 1) **anti-influenzale:** in qualsiasi momento della gravidanza;
 - 2) **anti-covid:** in qualsiasi momento della gravidanza (autunno-inverno);
 - 3) **anti-difto-tetano-pertosse:** nel 3° trimestre di gravidanza.
- Questi 3 vaccini possono essere **co-somministrati**.

1 VACCINO ANTI-DIFTO-TETANO-PERTOSSE (dTp)

La **pertosse** è una malattia molto contagiosa che si trasmette con il respiro. Nei primi mesi di vita può causare gravi complicanze e portare persino al decesso.

Il **vaccino** contro pertosse e tetano è **sicuro** in gravidanza, per la mamma e per il bambino.

È necessario sottoporsi a due vaccinazioni?

No, i vaccini contro **pertosse e tetano sono uniti in un unico preparato** e vengono quindi somministrati insieme, in un'unica volta. Non esiste vaccino monocomponente.

Ho già avuto la pertosse, posso evitare il vaccino?

Anche se hai già avuto la pertosse, l'immunità data dalla malattia **non è perenne ed è molto labile**.

Ho già fatto il vaccino contro la pertosse in passato, sono protetta?

Anche se sei già stata vaccinata in passato, **gli anticorpi indotti dalla vaccinazione diminuiscono progressivamente**, quindi il richiamo è indicato durante **ogni gravidanza**.

Quando devo fare la vaccinazione durante la gravidanza?

La vaccinazione deve essere fatta nel **3° trimestre** di gravidanza, per permettere alla madre di produrre anticorpi protettivi per sé e per il nascituro, che lo proteggeranno nei delicati primi mesi di vita, finché non riceverà le prime 2 dosi di vaccino.

2 VACCINO ANTI-INFLUENZALE STAGIONALE

Perché per la MAMMA è importante fare il vaccino antinfluenzale?

Con l'avanzare della gravidanza l'organismo va incontro a modifiche che riguardano, tra l'altro, la circolazione sanguigna e l'apparato respiratorio. La donna in attesa si trova in una situazione di maggiore fragilità. È infatti documentato che **le donne in gravidanza che si ammalano di influenza hanno un rischio più alto** di essere ricoverate in ospedale per le complicanze dell'infezione rispetto alle loro coetanee.

Perché per il BAMBINO è importante che la mamma si vaccini?

L'influenza stagionale può causare **aborto, parto prematuro, scarsa crescita fetale, malformazioni fetali**. Nel neonato può determinare gravi forme respiratorie con necessità di ricovero in Terapia Intensiva Neonatale.

3 VACCINO ANTI-COVID

La gravidanza è associata ad un aumento pari a 3 volte del rischio di ricovero in terapia intensiva rispetto alle donne non gravide.

Gli anticorpi SARS-CoV-2 indotti dal vaccino, simili agli anticorpi acquisiti dopo infezione, sono protettivi contro l'infezione nel neonato.

La vaccinazione anti-COVID-19 (ciclo primario, 1° e 2° booster) è **raccomandata a TUTTE LE GESTANTI IN QUALSIASI MOMENTO DELLA GRAVIDANZA**

Va utilizzato **vaccino ad mRNA**.