



Ospedale  
di Cremona

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Cremona

## COMMUNICATION AU PATIENT DEVANT RÉALISER L'HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE PAR VOIE ORALE (HGPO)

### **HYPERGLYCÉMIE PROVOQUÉE PAR VOIE ORALE**

#### **Introduction**

Avant de procéder au test, une glycémie capillaire (prélèvement au doigt, méthode POCT) est réalisée afin d'identifier les patients présentant une glycémie supérieure à 126 mg/dl.

- Si la glycémie est inférieure à 126 mg/dl, le patient est considéré comme apte et peut poursuivre le test.
- Si la glycémie est supérieure à 126 mg/dl, la solution de glucose n'est pas administrée. Un premier prélèvement (glycémie basale) est effectué, puis le patient rentre à domicile en attendant la confirmation du résultat par le laboratoire.
- Lorsque le personnel soignant aura reçu le résultat du laboratoire, le patient sera contacté à son domicile. Il lui sera alors indiqué s'il pourra effectuer le test à une date ultérieure ou s'il devra directement prendre rendez-vous au Centre antidiabétique sans réaliser le test.

#### **Procédure :**

Le test consiste à effectuer deux prélèvements sanguins à deux heures d'intervalle l'un de l'autre. Pour les patientes enceintes, trois prélèvements sont réalisés, à 1 heure d'intervalle l'un de l'autre.

Après le premier prélèvement, une solution de glucose est administrée par voie orale : il s'agit d'ingérer 75 g de glucose, fournis par le personnel soignant. Le bolus de glucose doit être ingéré en un temps relativement court (5 minutes).

L'ingestion peut provoquer un malaise (nausées, vomissements, etc.). Les prélèvements suivants doivent être réalisés **strictement** à l'heure prévue.

**IL EST FORMELLEMENT INTERDIT, APRÈS L'ADMINISTRATION DE LA SOLUTION DE GLUCOSE ET DANS L'ATTENTE DES PRÉLÈVEMENTS SUIVANTS, DE QUITTER LE CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS : LE PERSONNEL SOIGNANT DOIT POUVOIR SURVEILLER L'ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT.**

**II EST ÉGALEMENT STRICTEMENT INTERDIT DE CONSOMMER DES ALIMENTS PENDANT L'ATTENTE.**