



Ospedale
di Cremona

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Cremona

EXAMEN PARASITOLOGIQUE DES SELLES

RECUEIL DES SELLES

Précautions importantes :

Quelques jours avant et pendant la période de recueil des selles :

- Ne pas utiliser de laxatifs, antidiarrhéiques, antimicrobiens, ni d'autres substances interférentes telles que le baryum, le bismuth ou les huiles minérales.
- Il est conseillé de suivre un régime alimentaire spécifique en évitant : les légumineuses et les fruits secs, les fruits et légumes à peau dure (pêches, abricots, tomates, poires, fraises, figues), les carottes et les bananes.

Matériel nécessaire :

- Récipient à bouchon vissé muni d'une petite spatule de prélèvement, disponible gratuitement auprès du centre de prélèvements choisi ou en pharmacie.

Recueil de l'ÉCHANTILLON :

Recueillir les selles sur une surface propre et sèche, par exemple :




- un bassin de lit,
- un sachet en plastique ou une feuille de papier placée dans le bidet ou dans un conteneur.

Attention : **NE PAS** émettre les selles directement dans la cuvette des toilettes.
NE PAS contaminer l'échantillon avec de l'urine.
METTRE les selles dans le récipient prévu.



- **Selles formées** : à l'aide de la spatule fixée au couvercle, prélever environ 10 à 20 g de selles (équivalent à une noix) et les déposer dans le récipient (environ un tiers de son volume).
- **Selles liquides** : transvaser environ 10 à 20 ml dans le récipient (environ un tiers de sa capacité).
Les récipients contenant une quantité insuffisante de matière (nettement inférieure à un tiers du volume) ou excessive (remplis jusqu'au bord) ne seront pas acceptés.
- Bien refermer le récipient et se laver soigneusement les mains.



Conservation et transport :

- Avant de remettre le matériel au centre de prélèvements, les échantillons peuvent être conservés au réfrigérateur (4–8 °C) pendant maximum 24 heures.
- Remettre l'échantillon de selles au centre de prélèvements choisi pendant les heures d'ouverture.
- Les échantillons de **selles diarrhéiques** avec suspicion d'amibiase doivent être envoyés dans les 30 minutes suivant le prélèvement au laboratoire de Microbiologie de l'Hôpital de Crémone (0372 405455), dans un récipient sans agent conservateur.